03

Port systématique du préservatif chez les adolescents et jeunes au Service de Santé Scolaire et Universitaire d'Agboville (Sud-Est de la Côte d'Ivoire)

Systematic condom use among adolescents and young people at the School and University Health Service in Agboville (Southeast Côte d'Ivoire)

N'drin Yapi David Gautier.

Service de Santé Scolaire et Universitaire Santé Adolescents et Jeunes, Département d'Agboville, République de Côte d'Ivoire.

Résumé

Introduction : La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes demeure un enjeu majeur en Afrique subsaharienne, avec une utilisation systématique du préservatif encore insuffisante en Côte d'Ivoire, notamment à Agboville.

Objectif : Étudier la pratique du port systématique du préservatif et identifier les freins à sa non-utilisation chez les adolescents et jeunes consultant au SSSU-SAJ d'Agboville.

Méthodes : Étude descriptive menée auprès de 97 jeunes, avec collecte par entretiens individuels.

Résultats : 62,89% n'utilisaient pas systématiquement le préservatif. La non-utilisation était plus fréquente chez les non scolarisés (72,22%) et chez ceux résidant hors d'Agboville (94,44%). Les principaux freins et attitudes étaient : baisse de la sensation (59,01%), influence des pairs (16,39%), manque de connaissance (11,48%), absence d'intérêt (8,2%) et oubli (4,92%).

Conclusion : Le port systématique du préservatif est faiblement utilisé et influencé par des facteurs individuels, sociaux et structurels.

Message de santé publique : Des stratégies intégrées telles que l'éducation sexuelle, implication des pairs/parents, accessibilité discrète et gratuite, outils numériques sont nécessaires pour améliorer cette situation.

Mots-clés : Santé sexuelle, Adolescents, Préservatif, Comportements à risque, Prévention,

Abstract

Introduction : Sexual and reproductive health among adolescents and young people remains a major public health issue in sub-Saharan Africa. In Côte d'Ivoire, consistent condom use remains low despite awareness-raising efforts, particularly in Agboville where STIs, early pregnancies and HIV/AIDS are still frequent.

Objective: To assess consistent condom, use and identify barriers to non-use among adolescents and young people attending the School and University Health Service for Adolescents and Youth in Agboville.

Methods: Descriptive study conducted with 97 young people, with data collected through individual interviews.

Results: 62.9% did not consistently use condoms during sexual intercourse. Non-use was higher among out-of-school youth (72.2%) and those living outside the municipality of Agboville (94.4%). The main barriers were reduced sexual sensation (59.0%), peer influence (16.4%), lack of knowledge about condom use (11.5%), lack of interest (8.2%) and forgetfulness (4.9%).

Conclusion: Consistent condom use is low and influenced by individual, social, and structural factors.

Public Health message : Integrated strategies such as sex education, peer/parent involvement, discreet and free access, and digital tools are needed to improve this situation.

Keywords: Sexual health, Adolescents, Condom, Risk behaviors, Prevention.

Introduction

La santé sexuelle et reproductive est un enjeu majeur en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, où environ 30 % de la population est constituée de jeunes confrontés à des risques tels que les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH/SIDA et les grossesses précoces [1].

Le préservatif reste l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir ces risques, mais son utilisation reste faible chez les jeunes, malgré les efforts de sensibilisation [2]. À Agboville, la cellule santé scolaire et universitaire joue un rôle important dans la promotion des comportements sexuels responsables, mais des rapports de terrain montrent une adoption limitée du préservatif [2, 3].

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, tels qu'un accès insuffisant aux préservatifs, des croyances sociales négatives, un manque de communication sur la sexualité [3]. Leur analyse permettrait de comprendre les comportements des jeunes face à l'utilisation du préservatif et les obstacles à son adoption systématique [4]. Notre objectif était d'étudier la pratique du port systématique du préservatif chez les adolescents et jeunes.

Méthodes

L'étude transversale descriptive a été réalisée dans le service de santé scolaire et universitaire d'Agboville du 15 Juillet au 30 Juillet 2025.

Tous les adolescents et jeunes venus en consultation pendant la période de l'étude et consentant à y participer ont été inclus. Un questionnaire individuel a été administré par interview.

La réalisation de notre étude a reçu l'autorisation du médecin chef du service de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes du département d'Agboville. Le consentement éclairé des adolescents et jeunes venus a été obtenu. La confidentialité et l'anonymat ont été respectés.

Résultats

Nous avons enregistré 97 adolescents et jeunes pendant la période d'étude.

Les caractéristiques sociodémographiques des adolescents et jeunes sont présentées dans le tableau I.

TABLEAU I : Répartition des consultants selon les caractéristiques socio-démographiques (N=97)

Variables	Modalités	Effectif	(%)
Âge (années)	< 16	20	20,6
	[16-24[	65	67,0
	≥24	12	12,4
Sexe	Masculin	60	61,9
	Féminin	37	38,1
Profession	Scolarisés	72	74,2
	Non scolarisés	25	25,8
Type d'établissement	Public	32	44,4
	Privé	40	55,6
Domicile	Commune Agboville	87	89,7
	Hors commune Agboville	10	10,3
Niveau d'étude	Aucun niveau	25	25,8
	Primaire	1	1,0
	Secondaire	66	66,0
	Supérieur	5	5,2

La majorité des élèves avait une tranche d'âge comprise entre 16 et 24 ans. Le sexe masculin était prédominant avec un sex-ratio (H/F) de 1,62 et trois-quarts étaient scolarisés.

55,6% des consultants fréquentaient les établissements privés.

Les caractéristiques de l'utilisation des préservatifs pendant les rapports sexuels sont présentées dans le tableau II.

TABLEAU II : Caractéristiques des consultants n'utilisant pas systématiquement les préservatifs pendant les rapports sexuels (N=97)

Variables	Modalités	Effectif	(%)
Utilisation des préservatifs	Oui	36	37,11
	Non	61	62,89
Âge (années)	< 16	5	8,19
	[16-24[	46	75,4
	≥24	10	16,39
Sexe	Masculin	34	55,74
	Féminin	27	44,26
Profession	Scolarisés	17	27,78
	Non scolarisés	44	72,22
Type d'établissement	Public	41	66,67
	Privé	20	33,33
Domicile	Commune Agboville	3	5,56
	Hors commune Agboville	58	94,44
Motifs de non-utilisation des préservatifs	Baisse de sensation	36	59,01
	Influence des pairs	10	16,39
	Manque d'intérêt	5	8,2
	Manque de connaissance	7	11,48
	Oubli	3	4,92

La majorité des élèves n'utilisait pas systématiquement les préservatifs (62,9%).

Les non-utilisateurs des préservatifs étaient majoritairement dans la tranche d'âge des moins de 16 ans (8,20%), des hommes (55,7%) et non scolarisés (72,2%). Ils étaient scolarisés au public (66,7%) et résidaient pratiquement tous hors de la commune d'Agboville (94,4%).

Les élèves d'âge compris entre 16 et 24 ans représentaient les trois-quarts des utilisateurs systématiques des préservatifs.

Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer la non-utilisation des préservatifs dont la principale était la baisse de la sensation de plaisir pendant les rapports sexuels avec le port des préservatifs (59,0%).

Discussion

Le préservatif, lorsqu'il est utilisé correctement, reste une méthode clé de prévention des Infections Sexuellement Transmissibles et des grossesses non désirées. Cependant, son utilisation systématique demeure faible chez les jeunes à Agboville, les exposant ainsi aux risques sexuels (IST/VIH, grossesse non désirée) [5]. Cette situation peut être expliquée par des facteurs individuels, relationnels et contextuels. L'absence d'éducation sexuelle adéquate, notamment par les programmes d'éducation complète à la sexualité (ECS), limite l'adoption du préservatif. En Côte d'Ivoire, des politiques de communication et de services adaptés visent à répondre à ces défis [6]. Par ailleurs, des inégalités d'accès aux services de santé sexuelle et aux préservatifs, ainsi que des normes sociales variées en fonction des lieux de résidence, influencent également l'utilisation du préservatif [6, 8]. Les barrières déclarées incluaient la « baisse de la sensation de plaisir » et la pression des pairs, ce qui souligne la nécessité de messages positifs et centrés sur le plaisir, ainsi que le développement de compétences de vie [6, 9]. Enfin, l'environnement de soins joue un rôle crucial, et des stratégies de communication locale sont nécessaires pour améliorer l'accès aux services [10].

Si le caractère descriptif et transversal de l'étude ne permet pas une généralisation des résultats, elle met tout de même en lumière des leviers pour améliorer l'usage du préservatif chez les jeunes.

Conclusion

La pratique du préservatif reste insuffisante chez les jeunes à Agboville, avec 62,89% ne l'utilisant pas systématiquement. Les freins incluent la baisse de sensation, l'influence des pairs, et le manque de connaissances. Des stratégies intégrées, incluant l'éducation sexuelle, l'implication des pairs et l'accès discret aux préservatifs, sont nécessaires pour améliorer la prévention.

Références

1. Programme National de Santé Scolaire et Universitaire – Côte d'Ivoire (2023). *Rapport annuel d'activités*.
2. OMS (2022). *La santé sexuelle et reproductive des adolescents : directives à l'intention des services de santé*.
3. ONUSIDA (2023). *Rapport mondial sur le VIH/SIDA*.
4. World Health Organization. Condoms [Internet]. Geneva: WHO; 2025 Feb 14 [cited 2025 Dec 9]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/condoms
5. République de Côte d'Ivoire, Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida. Politique nationale de santé des adolescents et des jeunes 2016–2020 [Internet]. Abidjan: MSLS; 2016 [cited 2025 Dec 9]. Available from: https://sante.gouv.ci/userfiles/file/Politique%20Nationale%20Sant%C3%A9%20Adolescents%20et%20Jeunes.
6. UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, World Health Organization. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach. Revised edition [Internet]. Paris: UNESCO; 2018 [cited 2025 Dec 9]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/
7. Analogbei T, Dear N, Reed D, et al; AFRICOS Study Group. Predictors and barriers to condom use in the African Cohort Study. AIDS Patient Care STDS. 2020 ; 34 (5) : 228-236.
8. Kanda LL, Mash R. Reasons for inconsistent condom use by young adults in Mahalapye, Botswana. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2018 ; 10(1).
9. Koné NA, Coulibaly SH. Perceptions et accessibilité des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive dans la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique. 2024 ; 6(3) : 138-153.
10. Rwenge JRM, Djourdebbe FB, Ekambi Ekambi E. Social and individual factors associated with condom use among single youths: an analysis of the 2018 Cameroon Demographic and Health Survey. J Biosoc Sci. 2022 ; 54 (2) : 295-321.